



Pflichttext gemäß § 4 Heilmittelwerbegesetz

medichem Haut-Desinfektion 2-Propanol 70 % (v/v)

Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: 100 g Lösung enthalten: 63,1 g 2-Propanol
Sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser. Art der Anwendung: Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen.

Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlumschläge.

Gegenanzeigen: Ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Warnhinweise: Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Hinweise: Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. Wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente nicht geeignet.

Pharmazeutischer Unternehmer: Dr. Schumacher GmbH, 34323 Malsfeld, Tel. 05664-94960

Sollten Sie als Kunde nicht zum Fachkreis im Sinne des HWG gehören, beachten Sie bitte noch folgendes: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.