

Pflichttext gemäß § 4 Heilmittelwerbegesetz

Quickpad

Stoff- oder Indikationsgruppe: Desinfektionsmittel / Antiseptikum

Anwendungsgebiete: Zur Desinfektion der Haut vor Injektionen

Gegenanzeigen: Nicht anwenden: bei Überempfindlichkeit gegen 2-Propanol (Isopropylalkohol) zur Hautdesinfektion vor Eingriffen, die eine größere Eröffnung erfordern als eine Injektion zur Antiseptik offener Wunden, zur Schleimhautantiseptik, insbesondere am Auge zur Hautdesinfektion bei Frühgeborenen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: keine Anwendung auf Schleimhäuten, insbesondere dem Auge. Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Bei sachgemäßem Gebrauch kann QUICKPAD® während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.


Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: Zur Desinfektion/Antiseptik die betroffene Hautfläche mit QUICKPAD® abreiben und trocknen lassen. Als Mindesteinwirkzeit sind 15 s einzuhalten.

Dauer der Anwendung: QUICKPAD® kann ohne zeitliche Begrenzung angewendet werden.

Nebenwirkungen: Bei Hauteinreibungen mit 2-Propanol (Ph.Eur) 70 % (V/V) können in sehr seltenen Fällen (dies entspricht weniger als 1 von 10.000 Behandelten) Hautrötungen und leichtes Brennen auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder medizinisches Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.



Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Kunststoffbehältnis angegeben. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate. Lagerungshinweise: Vor Feuer schützen! Letzten Tupfer nicht aufbewahren, mögliches Eintrocknen. Dose gut verschlossen halten. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zusammensetzung: 1 Kunststoff-behältnis mit 150 getränkten Tupfern enthält pro Tupfer: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 2-Propanol (Ph. Eur.) 70% (V/V): 0,41 g Sonstige Bestandteile: Vliestupfer aus Polypropylen: 0,12 g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: HOLTSCHE Medizinprodukte GmbH, In den Faltern 13, D-65232 Taunusstein

Sollten Sie als Kunde nicht zum Fachkreis im Sinne des HWG gehören, beachten Sie bitte noch folgendes: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.